



Regione Siciliana

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI POZZALLO (RG)



Via Isole Filippine s.n.c. - 97016 - POZZALLO (RG) - ☐ 0932956450 – C.M. RGEE02600V
sito internet: www.circolodidatticopozzallo.edu.it ✉ rgee02600v@istruzione.it
✉ PEC: rgee02600v@pec.istruzione.it
C.F. 81001290881 - *codice univoco dell'ufficio* : UFZOJV

Ai genitori della scuola PRIMARIA

Al genitori della scuola dell'infanzia

Al Personale docente e ATA

AI SITO

LORO SEDI

DIREZIONE DIDATTICA STATALE POZZALLO
Prot. 0003267 del 19/05/2023
I (Uscita)

Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina A.S. 2022/23¹ - Trasmissione Circolare Ministero della Salute 11710-12/04/2023-DGPRE-DGPRE-P recante "Aumento dell'incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da streptococco di gruppo A"

A seguito dell'aumento dell'incidenza di scarlattina nel nostro territorio, si richiamano le principali norme di profilassi previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

☐ Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per sette giorni a partire dall'ultimo contatto con il caso di scarlattina. Si ricorda che la malattia si trasmette per via aerea tramite grosse goccioline respiratorie. La sorveglianza sanitaria consiste nel rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre ed eventuale esantema.

☐ Recarsi, solo in presenza di tale sintomatologia, dal proprio medico curante/pediatra per richiedere, a giudizio del medico, l'effettuazione del Tampone Faringeo per la ricerca dei germi comuni. Nel caso la risposta sia positiva per streptococco beta-emolitico di gruppo A, ritornare dal proprio medico curante per eventuali ed idonee prescrizioni.

☐ Misure di igiene ambientale: Aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli con prodotti disinfettanti di uso comune.

Per la riammissione a scuola è necessario che i genitori consegnino a scuola il certificato del medico curante che attesta la pronta guarigione del/la proprio/a figlio/a.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

DEFINIZIONE

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A. Questo germe può essere responsabile anche di altre malattie quali la tonsillite e l'impetigine (o piodermite, che è un'infezione della cute). Poiché esistono diversi ceppi di questo Streptococco, ci si può ammalare di scarlattina più volte. È una malattia che colpisce soprattutto i bambini in età scolare (mentre è molto rara prima dei 6 mesi di vita).

¹ https://www.odmeo.re.it/fnomceo-circolare-ministero-della-salute-11710-12-04-2023-dgpre-dgpre-p-recante-aumento-dellincidenza-di-scarlattina-e-di-infezione-invasiva-da-streptococco-di-gruppo-a/#:~:text=2022-,_FNOMCeO%3A%20Circolare%20Ministero%20della%20Salute%2011710%2D12%2F04%2F,da%20streptococco%20di%20gruppo%20A%E2%80%9D&text=Si%20trasmette%20la%20Comunicazione%20n,interesse%20per%20l'ambito%20sanitario.



Regione Siciliana

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI POZZALLO (RG)



Via Isole Filippine s.n.c. - 97016 - POZZALLO (RG) - ☐ 0932956450 – C.M. RGEE02600V
sito internet: www.circolodidatticopozzallo.edu.it ✉ rgee02600v@istruzione.it
✉ PEC: rgee02600v@pec.istruzione.it
C.F. 81001290881 - *codice univoco dell'ufficio* : UFZOJV

DESCRIZIONE

Come ci si contagia

Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione

In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità

In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione

L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

Cosa fare quando si verifica un caso

Essendo una malattia batterica si cura con idonei antibiotici, anche allo scopo di prevenire la malattia reumatica, per cui, nel sospetto, è sempre bene consultare il medico. Tenere a casa la persona fino a quando è malata e, comunque, per almeno 24 ore dall'inizio della terapia antibiotica, evitando il contatto diretto con altri bambini.

Rischio di diffusione nella scuola

Medio. La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso.

Riammissione a scuola

Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute, attestate da regolare certificato medico di pronta guarigione, da consegnare a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Cosimo di Giorgio

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)